

Valor Nutritivo de la Pulpa de Café sometida a Fermentación Sólida usando *Aspergillus niger* en Pollos y Cerdos¹

Mario R. Molina², Otto Raúl Lechuga y Ricardo Bressani

COMPENDIO

Pulpa de café fue sometida a fermentación sólida usando *Aspergillus niger*, humedad inicial 80%, pH 3.5, 35°C y adicionando 2.5% de urea comercial y 2.0% de fosfato dicálcico comercial, por 48 h. El material fermentado, secado al sol, probó tener un contenido de polifenoles, cafeína y fibra significativamente menor ($P < 0.05$) que la pulpa original secada al sol. Además, la proteína verdadera de la pulpa fermentada (18%) probó ser significativamente ($P < 0.01$) mayor que la del material original (5%). Al incorporar la pulpa en niveles de 5, 10 y 15% en raciones para pollos de engorde en crecimiento se encontró que después de 6 semanas la ración conteniendo 15% de pulpa fermentada presentó una ganancia de peso (1.43 kg) y una eficiencia alimentaria (2.20) significativamente igual a la ración control sin pulpa y mejor ($P < 0.05$) que la ración conteniendo la pulpa sin fermentar a igual nivel de 15% (1.19 kg y 2.55, respectivamente). En el caso de cerdos en crecimiento alimentados por 8 semanas con raciones conteniendo el 20% de ambas pulpas se encontraron similares resultados. Se concluye que la fermentación sólida representa una alternativa tecnológica viable para mejorar el valor nutricional de la pulpa de café.

Palabras clave adicionales: Alimento para pollos y cerdos, nutrición.

INTRODUCCION

La posible utilización de la pulpa del café en alimentación animal ha sido investigada desde ya hace años. A través de tales investigaciones se ha podido establecer que la pulpa de café posee factores anti-nutricionales (o tóxicos) que limitan su uso en la alimentación animal, particularmente de animales monogástricos. Se ha podido establecer que dentro de tales factores los más nocivos son cafeína, polifenoles y el alto contenido de fibra de la pulpa, (Bressani, 1979). Consecuentemente, se han investigado alternativas para detoxificar este material que representa el subproducto más abundante del beneficiado del café (Braham, 1979; Molina *et al.*, 1974).

Una alternativa plausible ha comprobado ser el proceso de fermentación sólida usando *Aspergillus niger*. A través de este proceso se ha podido reducir significativamente ($P < 0.01$) los niveles de cafeína, polifenoles y fibra de la pulpa, a la vez que su contenido de proteína verdadera (representada por aminoácidos totales) se aumenta de un 5% a un 15% (Peñalosa *et al.*, 1985). Por lo mismo, pareció de interés determinar el valor nutritivo del material cuando forma parte de raciones para pollos y cerdos en crecimiento.

ABSTRACT

Coffee pulp was subjected to a solid-state fermentation process using *Aspergillus niger*, an initial moisture content of 80%, pH 3.5, 35°C and adding 2.5% commercial urea and 2.0% commercial dicalcium phosphate, for a total of 48 h. The sun-dried fermented material proved to have a significantly ($P < 0.05$) lower polyphenolic, caffeine and fiber content than the original sun-dried coffee pulp. Further, the true protein content of the fermented material (18%) was significantly ($P < 0.01$) higher than that of the original material (5%). When the pulp was included at a 5, 10 and 15% levels in growing chicken rations it was found that after six weeks the ration containing 15% of the fermented pulp presented a weight gain (1.43 kg) and a feed efficiency (2.20) significantly equal to the control ration (without pulp) and better ($P < 0.05$) than the ration containing the sun-dried, unfermented pulp at 15% (1.19 kg and 2.55, respectively). In the case of growing swine fed with rations containing either fermented or unfermented pulp at 20% level for 8 weeks the results were similar to those obtained in the chicken experiment. It is concluded that solid-state fermentation represents a viable technological alternative to improve the nutritional value of coffee pulp.

MATERIALES Y METODOS

La pulpa de café usada en el presente estudio fue obtenida en un beneficio de Amatitlán (Guatemala). La misma fue recolectada el mismo día de su procesamiento y secada al sol en las facilidades del INCAP. Una vez seca la pulpa fue separada en dos lotes. Un lote fue sometido a fermentación sólida, mientras que el otro fue almacenado para usarse como pulpa sin fermentar. Ambos lotes fueron molidos a 60 mallas. La fermentación sólida se efectuó colocando 68.4 kg de pulpa ajustada al 80% de humedad y agregada con urea (2.5%) y fosfato dicálcico (2.0%), ambos de calidad comercial, en bandejas de 1.0 x 1.2 x 0.1 m con fondo de malla plástica de 60 mallas. Esta pulpa fue inoculada con 2×10^7 esporas viables de *A. niger* y el material fue incubado en un cuarto a 35°C y 80% de humedad relativa, por un total de 48 h. Al final de este tiempo, el material fue secado al sol y molido a 60 mallas en un molino de marillos (Rivera, 1988).

¹Presentado en la XXXV Reunión Anual del PCCMCA, San Pedro Sula, Honduras, 1989

Este estudio fue financiado con fondos provistos por la AID de los Estados Unidos (Proyecto INCAP 550) Publicación INCAP E-1288

²Científico, División Ciencias Agrícolas y de Alimentos, INCAP, Apartado Postal 1188, Guatemala City, Guatemala, C.A.

Publicado en *Agronomía Mesoamericana* Vol 1 (1990)

Tanto la pulpa fermentada como la no fermentada fueron sometidas a análisis proximal, evaluaciones de aminoácidos totales, cafeína, polifenoles y fraccionamiento de paredes celulares (AOAC, 1975; Gómez-Brenes y Bressani, 1973; Ishler y Cal, 1948, Van Soest, 1963; Van Soest y Wine, 1967, 1968).

Con ambos materiales (pulpa fermentada y sin fermentar), se prepararon dietas para pollos y cerdos (Cuadros 1 y 2, respectivamente) Para el experimento en pollos se usaron 30 pollos por dieta, divididos en tres grupos de diez pollos cada uno. Los pollos se alimentaron con las dietas evaluadas a partir del tercer día de edad hasta la octava semana. La ingestión de alimento y el peso se controló semanalmente. Por separado, se pusieron tres grupos con la dieta control adicionada con la cafeína, la ceniza y una mezcla de estos dos más

el ácido tánico, contenidos en la dieta con 15% de pulpa no fermentada (Cuadro 1). Las condiciones experimentales fueron en general similares a las usadas en estudios previos (Bressani y González, 1978).

El experimento en cerdos se efectuó usando un total de 6 animales (de 6 a 7 semanas de edad), por dieta. Los cerdos fueron alimentados individualmente, controlándose la ingesta y ganancia de peso semanalmente, por un período total de 8 semanas. Las condiciones experimentales fueron similares a las usadas por Cuevas (1976).

RESULTADOS Y DISCUSION

La composición de la pulpa fermentada y de la pulpa sin fermentar se presenta en el Cuadro 3. Como puede

Cuadro 1 Formulación porcentual de dietas experimentales a utilizarse en el estudio de alimentación de pollos de engorde (Calculadas para 21% de proteína cruda)

| Ingredientes | Dietas No | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Harina de soya | 35 00 | 35 00 | 35 00 | 35 00 | 35 00 | 35 00 | 35 00 | 35 00 | 35 00 | 35 00 |
| Fosfato dicálcico | 2 10 | 2 10 | 2 10 | 2 10 | 2 10 | 2 10 | 2 10 | 2 10 | 2 10 | 2 10 |
| Carbonato de calcio | 1 50 | 1 50 | 1 50 | 1 50 | 1 50 | 1 50 | 1 50 | 1 50 | 1 50 | 1 50 |
| Sal yodada | 0 45 | 0 45 | 0 45 | 0 45 | 0 45 | 0 45 | 0 45 | 0 45 | 0 45 | 0 45 |
| Premix-100 Pfizer | 0 55 | 0 55 | 0 55 | 0 55 | 0 55 | 0 55 | 0 55 | 0 55 | 0 55 | 0 55 |
| DL-Metionina | 0 10 | 0 10 | 0 10 | 0 10 | 0 10 | 0 10 | 0 10 | 0 10 | 0 10 | 0 10 |
| Aceite de algodón | 5 00 | 5 00 | 5 00 | 5 00 | 5 00 | 5 00 | 5 00 | 5 00 | 5 00 | 5 00 |
| Maíz amarillo | 55 30 | 50 30 | 45 30 | 40 30 | 50 30 † | 45 30 | 40 30 | 53 20 | 55 16 | 52 27 |
| Pulpa de café | | | | | | | | | | |
| a Sin fermentar | -- | 5 00 | 10 00 | 15 00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| b Fermentada | -- | -- | -- | -- | 5 00 | 10 00 | 15 00 | -- | -- | -- |
| Cenizas de 15 lb de pulpa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 10 | -- | 2 10 |
| Cafeína | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 14 | 0 14 |
| Acido tánico | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 79 |
| TOTAL | 100 00 |

Cuadro 2 Formulación de dietas experimentales a usarse en estudio de engorde de cerdos (expresadas porcentualmente, calculadas para 21% de proteína cruda)

| Ingredientes | Dieta No | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| Harina de soya | 35 00 | 35 00 | 35 00 |
| Fosfato dicálcico | 2 10 | 2 10 | 2 10 |
| Carbonato de calcio | 1 50 | 1 50 | 1 50 |
| Sal yodada | 0 45 | 0 45 | 0 45 |
| Premix-100 Pfizer | 0 83 | 0 83 | 0 83 |
| DL-Metionina | 0 10 | 0 10 | 0 10 |
| Aceite de algodón | 5 00 | 5 00 | 5 00 |
| Maíz amarillo | 55 02 | 35 02 | 35 02 |
| Pulpa de café | | | |
| a Sin fermentar | -- | 20 00 | -- |
| b Fermentada | -- | -- | 20 00 |
| TOTAL | 100 00 | 100 00 | 100 00 |

Cuadro 3 Composición porcentual de la pulpa de café sin fermentar y sujeta a fermentación sólida, usando *Aspergillus niger* y la tecnología de fermentación por bandeja*

| Componente | Concentración (%) | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | Pulpa sin Fermentar | Producto Fermentado |
| Extracto etéreo | 2 47 | 1 91 |
| Nitrógeno total | 1 83 | 1 8 27 |
| Aminoácidos totales | 5 37 | 1 8 02 |
| Ceniza | 5 97 | 12 84 |
| Potasio | 1 48 | 1 12 |
| Fibra cruda | 23 79 | 16 27 |
| Fibra neutro detergente** | 45 48 | 38 52 |
| Fibra ácido detergente** | 44 24 | 37 00 |
| Celulosa** | 25 31 | 1 8 83 |
| Hemicelulosa** | 3 23 | 1 69 |
| Lignina** | 21 54 | 20 80 |
| Cafeína | 0 98 | 0 72 |
| Polifenoles | 5 34 | 1 54 |

* Valores promedio de 10 muestras, aproximadamente
 ** Componentes de las paredes celulares

apreciarse, el proceso de fermentación sólida fue capaz de disminuir los niveles de cafeína, polifenoles y fibra, componentes que se han citado como los factores anti-nutricionales más importantes de la pulpa de café, cuando ésta se considera para la formulación de raciones para animales monogástricos. Las disminuciones citadas probaron ser significativas ($P < 0.05$). La disminución en fibra puede explicarse por la caída en celulosa y hemicelulosa, principalmente observada al efectuar el fraccionamiento de las paredes celulares. La proteína verdadera puede observarse que aumenta de un 5 a un 18%

La ganancia de peso, consumo de alimento y eficiencia alimenticia, obtenidos en el experimento con pollos puede observarse en el Cuadro 4. Como puede notarse, las diferencias entre los grupos alimentados con las raciones con pulpa fermentada y aquellos con las que contenían pulpa sin fermentar, son más evidentes entre los grupos recibiendo la ración mayor concentración de pulpa (15%) En este caso se evidencia ya, que mientras el grupo recibiendo la ración con 15% de pulpa fermentada presenta una ganancia de peso y eficiencia alimenticia estadísticamente similar al grupo control, el grupo recibiendo la ración con 15% de pulpa sin fermentar presenta un comportamiento significativamente ($P < 0.05$) inferior en

ambos parámetros. Estos datos señalan ya un efecto benéfico significativo de la fermentación sólida sobre el valor nutritivo de la pulpa de café

Al comparar estos datos con los encontrados con la ración control adicionada con cafeína, o cenizas de pulpa, o una combinación de estos dos componentes más ácido tánico (todos a la concentración encontrada en la ración con pulpa sin fermentar al 15%), podemos observar (Cuadro 5), que la dieta de menor calidad resultó ser la dieta adicionada con 0.14% de cafeína únicamente, indicando que éste es quizás el factor anti-nutricional más importante en la pulpa de café. La adición del ácido tánico (al 0.79%) y las cenizas de la pulpa (al 2.10%), conjuntamente con la cafeína, parecen tener una acción protectora sobre los efectos de esta última, ya que el comportamiento de este grupo fue significativamente mejor ($P < 0.05$) que el alimentado con la ración conteniendo cafeína (al 0.14%) únicamente.

En el caso del experimento en cerdos (Cuadro 6), puede observarse claramente también el efecto benéfico de la fermentación sólida sobre la calidad nutricional de la pulpa del café. En todos los casos es evidente el mayor consumo obtenido en la dieta conteniendo la pulpa fermentada.

Cuadro 4. Ganancia de peso, consumo de alimento y eficiencia alimentaria de pollos de engorde alimentados con raciones conteniendo pulpa de café fermentada y sin fermentar*

| Parámetro | Ración Control | Raciones con pulpa de Café | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | Fermentada | | | Sin Fermentar | | |
| | | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 15% |
| Consumo de alimento (kg/6 sem) | 2.93 ± 0.12 ** | 3.12 ± 0.04 | 3.08 ± 0.05 | 3.14 ± 0.10 | 3.25 ± 0.09 | 3.16 ± 0.12 | 3.03 ± 0.17 |
| Ganancia de peso (kg/6 sem) | 1.44 ± 0.05 ab | 1.50 ± 0.05 a | 1.40 ± 0.06 ab | 1.43 ± 0.09 ab | 1.52 ± 0.08 a | 1.38 ± 0.04 ab | 1.19 ± 0.07 b |
| Eficiencia alimenticia | 2.03 ± 0.09 a | 2.08 ± 0.05 ab | 2.21 ± 0.09 ab | 2.20 ± 0.09 ab | 2.14 ± 0.08 ab | 2.29 ± 0.03 ab | 2.55 ± 0.09 c |

* Evaluado en 30 pollos de engorde por dieta, subdivididos en 3 grupos. Peso inicial promedio 80.9 g

** Desviación estándar del promedio. Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas ($P < 0.05$)

Incap 88-212

Cuadro 5. Ganancia de peso, consumo de alimento y eficiencia alimenticia de pollos alimentados con la dieta control sola y añadida con cafeína, cenizas de pulpa y ácido tánico*

| Parámetro Estimado | Ración Control | | | |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--|
| | Sin Ningún Aditivo | Con 0.14% de Cafeína | Con 2.10% de Cenizas | Con 0.14% Cafeína, 2.10% Cenizas y 0.79 Acido Tánico |
| Consumo de Alimento (kg/6 sem) | 2.93 ± 0.12 ab** | 1.82 ± 0.18 c | 2.91 ± 0.18 ab | 2.76 ± 0.08 b |
| Ganancia de Peso (kg/6 sem) | 1.44 ± 0.05 ab | 0.80 ± 0.12 c | 1.41 ± 0.18 ab | 1.28 ± 0.09 ab |
| Eficiencia Alimenticia | 2.03 ± 0.09 a | 2.30 ± 0.13 bc | 2.07 ± 0.12 ab | 2.17 ± 0.10 ab |

* Evaluados en 30 pollos por dieta, divididos en 3 grupos. Peso inicial promedio 80.9 g. La cantidad de cafeína, ácido tánico y cenizas de pulpa agregada fue la encontrada en la ración con 15% de pulpa sin fermentar

** Desviación estándar del promedio. Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas ($P < 0.05$)

Cuadro 6. Ganancia de peso, consumo de alimento y eficiencia alimentaria de cerdos alimentados con raciones conteniendo pulpa de café fermentada y sin fermentar

| Parámetro | Ración Control | Raciones con Pulpa (20%) | |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| | | Fermentada | Sin Fermentar |
| Consumo de alimento (kg/8 sem) | 78.56 ± 9.20 ** | 86.77 ± 8.60 | 76.36 ± 7.50 |
| Ganancia de peso (kg/8 sem) | 37.33 ± 3.37 a | 32.67 ± 1.89 a | 26.92 ± 4.48 b |
| Eficiencia alimenticia | 2.11 ± 0.26 a | 0.266 ± 0.026 b | 2.88 ± 0.35 b |

* Evaluado en 6 cerdos Landras, peso inicial promedio 17.5 kg. Consumo y ganancia de peso fueron estimados semanal e individualmente.

** Desviación estándar del promedio. Letras diferentes indican diferencia estadísticamente significativa (P<0.05)

Debido a estos datos, ahora se efectúa un estudio de costos para determinar la viabilidad económica del proceso de fermentación sólida, a fin de proponerlo como una alternativa que permita usar un subproducto agrícola de la región en alimentación animal, sustituyendo un grano como el maíz que puede emplearse para consumo humano

BIBLIOGRAFIA

ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS (AOAC) 1975 "Official methods of analysis of the AOAC", 12 ed Association of Official Analytical Chemists, Washington, D C, U S A 1094 p

BRAHAM, J E 1979 Coffee pulp in other species /n "Coffee pulp Composition, technology and utilization" J E Braham y R Bressani (Eds) Publicación IDRC No 108e, International Development Research Centre, Ottawa, Canadá. p 51-54

BRESSANI, R 1979 Antiphsiological factors in coffee pulp /n "Coffee pulp Composition, technology, and utilization" J E Braham y R Bressani (Eds) Publicación IDRC No 108 e, International Development Research Centre, Ottawa, Canadá pp 83-88

-----, GONZALEZ, J.M 1978 Evaluación de la pulpa de café como posible sustituto del maíz en raciones para pollos de carne Arch Latinoamer Nutr (GUA), 28 208-221

CUEVAS, R 1976 Optimización y factibilidad económica del proceso de descafeinización de la pulpa de café. Tesis Mag Sc CESNA, GUA, Programa Universidad de San Carlos de Guatemala/IN-CAP 120 p. más anexos

GOMEZ-BRENES, R., BRESSANI, R. 1973 Método para la determinación de aminoácidos, aplicable a problemas de suplementación, fitomejoramiento y bioquímica nutricional Arch Latinoamer Nutr (GUA), 23 443-464

ISHLER, N H, FINUCANE, T P, BORKER, E. 1948 Rapid spectrophotometric determination of caffeine. Anal. Chem (U S A), 20 1162-1166.

MOLINA, M R, DE LA FUENTE, G; BATTEN, M A, BRESSANI, R. 1974 Decaffeination. A process to detoxify coffee pulp J Agric. Food Chem (U S A), 22 1055-1059

PEÑALOZA, W, MOLINA, M R, GOMEZ-BRENES, R; BRESSANI, R. 1985 Solid-state fermentation. An alternative to improve the nutritive value of coffee pulp Appl Environ Microbiol (U S A), 49 388-393

RIVERA, J L. 1988 Diseño y evaluación del proceso de fermentación sólida de la pulpa de café Tesis Ing Quím, Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala 51 p más anexos

VAN SOEST, P J 1963 Use of detergents in the analysis of fibrous feeds II A rapid method for the determination of fiber and lignin J Assoc. Off Anal Chem (U S A), 46 829-835

-----, WINE, R H 1967 Use of detergents in the analysis of fibrous feeds IV The determination of plant cell-wall constituents J Assoc Off Anal Chem (U S A), 50 50-55

----- 1968 Determination of lignin and cellulose in acid detergent fiber with permanganate. J Assoc Off Anal Chem (U S A), 51 780-785